

表1. 坪林區主要死亡原因

民國113年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	98	1,534.8	475.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	58	1,686.3	627.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	40	1,358.0	299.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	24	375.9	127.5	24.5	C00-C97	惡性腫瘤	19	*	*	32.8	C00-C97	惡性腫瘤	5	*	*	12.5
3	J12-J18	肺炎	15	*	*	15.3	J12-J18	肺炎	11	*	*	19.0	J12-J18	肺炎	4	*	*	10.0
4	E10-E14	糖尿病	8	*	*	8.2	E10-E14	糖尿病	5	*	*	8.6	E10-E14	糖尿病	3	*	*	7.5
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	7	*	*	7.1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	4	*	*	6.9	F01-F03	血管性及未明示之失智症	3	*	*	7.5
6	A40-A41	敗血症	4	*	*	4.1	A40-A41	敗血症	3	*	*	5.2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	3	*	*	7.5
7	I60-I69	腦血管疾病	4	*	*	4.1	I60-I69	腦血管疾病	3	*	*	5.2	I10-I15	高血壓性疾病	2	*	*	5.0
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	*	*	4.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	*	*	3.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2	*	*	5.0
9	F01-F03	血管性及未明示之失智症	3	*	*	3.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	*	*	3.4	R54	衰老／老邁／老年	2	*	*	5.0
10	I10-I15	高血壓性疾病	3	*	*	3.1	G20-G21	帕金森(氏)病	1	*	*	1.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	*	*	5.0
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	*	*	3.1	I10-I15	高血壓性疾病	1	*	*	1.7	A40-A41	敗血症	1	*	*	2.5
12	其他		23	360.2	141.2	23.5	其他		7	*	*	12.1	其他		13	*	*	32.5
13	R54	衰老／老邁／老年	3	*	*	3.1	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	*	*	1.7	I60-I69	腦血管疾病	1	*	*	2.5
14	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	*	*	2.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1	*	*	1.7	Q00-Q99	先天性畸形、變形與染色體異常	1	*	*	2.5
15	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2	*	*	2.0	M00-M99	肌肉骨骼系統與結締組織疾病	1	*	*	1.7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1	*	*	2.5
16	G20-G21	帕金森(氏)病	1	*	*	1.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1	*	*	1.7						
17	K25-K28	胃及十二指腸潰瘍	1	*	*	1.0	R54	衰老／老邁／老年	1	*	*	1.7						

附註： 1. 113年年中人口數計 6,385人, 男性 3,440人, 女性 2,946人。

2. 死亡人數未滿20人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)，爰以*呈現；排名可靠性也受其波及影響。